

LSV Wintergerste - Relativerträge Naturraum Marsch 2023

Ergebnisse aus Stufe 2 ⁽¹⁾

Sorte	Marschstandorte Schleswig-Holstein			Marsch gesamt mehrjährig ⁽²⁾
Versuchsstandort	Barlt	Sönke-Nissen-Koog	Mittel Marsch 2023	2018 - 2023
Bodenart / Ackerzahl	uL / 75	uL / 90	Ertragsdifferenz unbehandelt/behandelt	
rel. 100 = dt/ha	107,1	103,3	[%]	107,0
Drei- und mehrjährig im LSV geprüft				
KWS Orbit (G) *	101	97	16	97
SY Galileo (G, H) *	109	110	11	102
Jettoo (G, H)	109	111	14	103
Viola (G)	106	106	22	102
Esprit (G) *	99	97	13	101
Teuto (G) *	96	94	14	98
Bordeaux (zz, G) *	98	96	5	99
KWS Morris (G)	100	96	8	99
SU Midnight (2G) *	92	102	12	100
Zweijährig im LSV geprüft				
SY Dakoota (G)	107	107	11	103
Winnie (G) *	97	98	9	99
Avantasia (2G*) *	101	104	14	102
Julia (2G*) *	106	102	17	102
KWS Exquis (G, GV) *	102	99	12	99
SU Hetti (2G) *	103	103	9	100
Einjährig im LSV geprüft				
KWS Tardis (zz, G)	100	98	4	98
SY Loona (G, H) *	104	108	7	102
SU Virtuosa (G, GV) *	97	95	15	100
Integral (G, GV) *	96	95	7	98
GD 5 % (rel.)	7	6		-

⁽¹⁾ Stufe 2 mit ortsüblich-intensivem Fungizid- und Wachstumsreglereinsatz

H = Hybride, zz= zweizeilig, G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 (incl. Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus), 2G = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und zusätzlich Typ 2, 2G* = Gelbmosaikvirusresistenz Typ 1 und 2 ohne Resistenz gegen das Milde Gerstenmosaikvirus, GV = Resistenz gegen Gelbverzwergungsvirus (Resistenzgen yd2)

* Bezugsorten

⁽²⁾ Berechnung nach Hohenheim-Güzlöwer Serienauswertung unter Einbeziehung weiterer Sortenprüfungen