

Wirksamkeit ausgewählter Frühjahrs-Herbizide im Wintergetreide

+++ = sehr gute bis gute Wirkung

++ = befriedigende Wirkung

± = mäßige Wirkung

0 = Einse

Erkrankung = keine Wirkung

Stand: November 2023

Bemerkungen

Minderung der Wirkung bei Kamille beim Einsatz von Sulfonylharnstoffen durch Resistenz möglich.

Bionpower, Dash E C und Mero – Formulierungshilfsstoffe (EHS)

nz. = nicht zugelassen

LKSH, November 2023

¹ Minderung der Wirkung durch Resistenz möglich

x – Pflanzenschutzmittel dürfen nicht in oder unmittelbar an oberirdischen Gewässern und Küstengewässern angewandt werden.

In Schleswig-Holstein ist der länderspezifische Mindestabstand von 1 m an Gewässern nach § 26 Landeswassergesetz (LWG, 13.11.2019) zu beachten. Im Rahmen der GAP-Konditionalitäten-Verordnung ist ab 2023 ein 3 m breiter Pufferstreifen an Gewässern (Gl ÖZ 4) einzuhalten. In gewässerreichen Gemeinden darf der Abstand auf 1 m verringert werden (Landesverordnung; siehe wichtige Hinweise zur Anwendung von Pflanzenschutzmitteln).